



## Periokin spray 40 ml

Cena	<b>36,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>periokin_spr</b>

### Opis produktu

PERIOKIN Spray z zawartością chlorhexydyny (0,20%) - uznanego przez stomatologów składnika antybakteryjnego. Dzięki wygodnemu aplikatorowi idealny do miejscowego stosowania w zapobieganiu i leczeniu chorób dziąseł i przyzębia, w infekcjach jamy ustnej, zapaleniu i krwawieniu dziąseł oraz w praktyce stomatologicznej. Praktyczny dla pacjentów z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym, a także dla osób ze szczękosciskiem.

Pierwszy preparat chlorhexydyny w sprayu.

**NIE ZAWIERA ALKOHOLU**, dzięki czemu nie podrażnia śluzówki jamy ustnej (może być stosowany m.in. przez osoby z suchością jamy ustnej lub innymi schorzeniami śluzówki jamy ustnej, osoby po radioterapii).

Posiada przyjemny smak.

#### WSKAZANIA:

- choroby dziąseł i przyzębia
- krwawienie i zapalenie dziąseł
- choroby przyzębia: m.in. parodontoza, afty, pleśniawki, nadżerki
- odleżyny po źle dopasowanych uzupełnieniach protetycznych i ortodontycznych
- redukcja płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego
- usuwanie nieprzyjemnego zapachu z ust Periokin Spray

#### Dawkowanie i sposób użycia:

Otworzyć butelkę i umieścić rurkę aplikatora na dozowniku. Nacisnąć aplikator parę razy aż dozownik napełni się. Rozpylanie wykonywane jest poprzez naciśnięcie dozownika i skierowanie strumienia bezpośrednio na wrażliwe miejsce. Zaleca się wypluć rurkę aplikatora wodą i osuszyć. Stosować 4-5 dawek (rozpyleń) na wrażliwe miejsce, 2-3 razy dziennie. Przez co najmniej pół godziny po zastosowaniu nie zaleca się przyjmować napojów ani pokarmów.

Po użyciu preparatu nie płukać ust wodą.

Nie połykać.

Pojemność 40ml.

Polecamy również preparat Periokin Gel. Zarówno Periokin Spray jak i Periokin Gel posiadają ten sam skład. Wybór pomiędzy sprayem a żelem zależy od wygody stosowania przez pacjenta lub od wyboru stomatologa.